



برای مدیریت خوب گله، به چه  
مواردی توجه کنیم؟ (بخش دوم)



## شروع بره زایی:


اگرچه زمان بره زایی دوره پر کار و بعضاً گیج کننده‌ای است، اما داشتن یک دفترچه و خودکار برای ثبت مواردی چون تلفات و علل بروز سایر وقایع، برای برنامه ریزی آینده بسیار گرانبها است.





## بلافاصله بعد از تولد بره و بزغاله:

- تعداد سقط و تلفات بره‌ها را ثبت کنید.
- اقدامات معمول چون آغوز دادن، ضد عفونی کردن بند ناف و غیره را که در قسمت مراقبت از بره توضیح داده شده است انجام دهید.
- اگر سیستم پرورش بسته است، مراقب تراکم بره‌ها باشید.



## بعد از بره زایی:

- میش‌های سقط کرده را از بقیه دام‌ها جدا کنید.
- با دامپزشک خود در خصوص درمان ضد انگل دام‌هایی که علامت دارند مشورت کنید.





## بره‌ها در سن ۳ تا ۶ هفتگی:

- دریافت دوز اول واکسن کلستریدیایی
- مراقبت از بروز علائم نرمی استخوان و در صورت مشاهده، اقدامات فوری با مشورت دامپزشک.
- توجه زیاد به تمیز و خشک نگه داشتن بستر

## بره‌ها در سن ۶ هفتگی تا سه ماهگی :

- دریافت دوز دوم واکسن کلستریدیایی (با فاصله دو هفته از دوز اول)
- دریافت واکسن پاستورلوز در صورتی که خطر وقوع آن در گله زیاد است.
- دریافت واکسن بروسلوز در سن سه ماهگی





## در اواخر بهار و اوایل تابستان:

- کنترل لنگش (از حمام سم سولفات مس می‌توانید استفاده کنید)،
- مبارزه با انگل در دام‌هایی که علائم دارند (برای مشاهده علائم بیماری انگلی به پست مربوطه در این صفحه مراجعه کنید)،
- خرید دام از منابع مطمئن در صورت تصمیم به جایگزین کردن دام جدید



## در نهایت...

در برگه ای مشکلات رایج گله خود (برای مثال کمبود مس، بیماری عضله سفید، سقط جنین) را بنویسید تا برای فصل بعدی از آن مشکلات پیشگیری کنید.





## در نهایت...

دلایل بروز هر یک از مشکلات را نیز یادداشت کنید.

البته ممکن است شما تمام این علت‌ها را پیدا نکنید، اما هر چه تلاش کنید تا تعداد بیشتری

از دلایل مشکلات بوجود آمده را پیدا کنید، فصل بعدی را راحت تر و کم هزینه تر

پشت سر خواهید گذاشت.

